## POLLI DA CARNE

# DATI TECNICI

Consistenza media	62986	n°
Peso medio acquisto	0.04	kg/capo
Peso medio vendita	2.9	kg/capo
Mortalità	5	%
Vuoto sanitario per ciclo	7	giorni
Consumo di mangime aziendale (da report)	26.9	kg/capo/anno

#### ALIMENTAZIONE PER FASI

	Durata fase	Proteina grezza mangimi*	Fosforo mangimi*
	giorni	%	%
- fase 1	12	22.2	0.65
- fase 2	9	20.4	0.62
- fase 3	14	18.7	0.43
- fase 4	20	17.8	0.42
- fase 5	0	0	0
- fase 6	0	0	0
Durata ciclo	55		

Durata ciclo 55

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

#### RISULTATI DI BILANCIO

Fattore di riduzione azoto escreto	20.8966	%	segno + significa riduzione
Escrezione N (calcolo aziendale)	<u>282.5123</u>	kgN/t peso vivo	
Escrezione N polli da carne	0.2825	kgN/posto/anno	
Escrezione P polli da carne	0.1813	kgP2O5/posto/anno	

## Indici tecnici

Fattore di correzione kc	5.7399	n. cicli/anno
Variazione di peso vivo	16.4161	kg/capo/anno
Indice di conversione	1.8922	kg/kg t.q.
Consumo di mangime (stima modello)	31.0625	kg/capo/anno
Consumo di mangime (calcolo aziendale)	26.9	kg/capo/anno

## Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2024/0015803 del 02/04/2024 - Pag. 2 di 3

Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	0.866	
Contenuto medio di PG mangimi	19.4145	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0.0311	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0.0051	kg/kg t.q.

# Bilancio dell'azoto, kg/capo/anno

k_Nr avicoli da carne	0.03	kgN/kg carne	
k_volatilizzazione	0.3	0/0	
Consumo da modello	0.966	kgN/capo/anno	
Consumo corretto su dato aziendale	0.8366	kgN/capo/anno	
Ritenzione	0.4925	kgN/capo/anno	n c p
Escrezione (calcolo aziendale)	0.3441	kgN/capo/anno	
N al campo (calcolo aziendale)	0.2409	kgN/capo/anno	p c
N al campo da DM 25/02/2016 (peso medio = 1 kg)	0.25	kgN/capo/anno	р
Escrezione N (calcolo aziendale)	282.5123	kgN/t peso vivo	ta n
N al campo da DM 25/02/2016	250	kgN/t peso vivo	ta f.
Escrezione N da DM 25/02/2016	357.1429	kgN/t peso vivo	
Rilancio del fosforo	•		

N al campo per:

per:			
	peso	kgN/capo/anno	kgN/t peso vivo
polli da carne	1.0	0.25	250.0
pollastre	0.8	0.23	288.0
tacchini m.	9.0	1.49	165.0
tacchini f.	4.5	0.76	168.0
faraone	0.8	0.19	240.0

### Bilancio del fosforo, kg/capo/anno

k_Pr avicoli da carne	0.0025	kgP/kg carne
Consumo P (calcolo aziendale)	0.1372	kg/capo/anno
Ritenzione P	0.041	kg/capo/anno
Escrezione P	0.0962	kg/capo/anno

### Produzione aziendale di Azoto e Fosforo al campo, kg/anno

Produzione N da bilancio aziendale	15173.3274	kg N/anno
N al campo da DM 25/02/16	15746.5	kg N/anno
Produzione P da bilancio aziendale	6059.2532	kg P/anno

Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2024/0015803 del 02/04/2024 - Pag. 3 di 3